Farnento

1488MTP5



Vass2R02s126-130 1488Mtp5 Sundento 130

Farmento 4.5 \$ 10









= l'amento DESIGNATION CLOS | PLANCHED RANG S souche | 0 Vigueur : 2,5 PORT : (érig - 2 érig - couché. Pédoncule : L - M-C Millerandage : 6 Date de Véraison : 3-8 Date de Maturité : 31.870 🗡 Pourriture : O ty GRAPPE : G - M - P : L - M - CO BAIE : TG - G - M - P.13 disc. - sph. - ell. - ov. · obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N). SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s23 avec pépins - apyrène. s3 &c Jus : Inc. - coloré.

F'amento DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 5 RANG & Souche 10 Vigueur: 3,5 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C) Millerandage :0,5 Date de Véraison : 10.8 71 Date de Maturité : 14-9-71 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M- P : L - M - 6 BAIE : TG - G - M 14 8 13 disc. - sph or ell. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 s2 3 avec pépins - apyrène s32 JUS : inc /- coloré 843 s56

Tarnento DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S Souche 40 Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage : 50 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité: 5-9.12 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - (M) - C BAIE : TG - G - M - P 13x13 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 9 s2 8 s3 8 s4 8 s5 9 avec (pépins |- apyrène JUS :\inc. L coloré

Année: 1970
Emplacement ... 4-5 5 10 Désignation / Farnento

	! Nombre ! Total	!	D	ATES	E S		
	! d'yeux	1 27.3	1-4 !	<u>!</u> !	. !	!	
1	! 3	: 0	! 2!	!	!	!	
2	13	. 0	! 2 !			į	
3	: f	!		!	!	i	
4	i f	!			į		
5	12	! 1	12 !	į	!		

Année: 1971
Emplacement ... 4. 5. \$ 10 ... Désignation ... tamento...

!	Nombre !				DATES
!	Total d'yeux	30/3	2	14	
1 !	4	1	9	4	
2 !	9	1.	! 4	4	
37!	V		!		1 121(+11)
4)	1		!		De31-3.71 (+1)
5	4	1	13	4	

Année:
Emplacement ... 4 5 \$ 10 Désignation / Farmento....

!!!	!!	Nombre ! Total !	DATES					1
!	! d'yeux	14.3	17.3	20,3	<u> </u>	!	! !	
! 1	!!	4	0	0	2.	!	!	!!!!
! 2	!!	4	0	1	21.	1	!	!!!!
! 3	!!	4 !	1	12	3	!	!	
! 4	!!	4 !	6	0	2/ -	106	20-3-	Per !
! 5	!!	4 !	6	2	3	!	!	(4)

Désignation: Famento

Emplacement: 4.55104.2

(A) BOURGEONVENENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées on gouttière 6 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - ectonneuses 9.

44 - blanches Of fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3, - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Farnento

Désignation :

4.55100.2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzécs 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 60

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement : Farmento 4.5 \$ 10 4 - 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 3 - vert

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº orare 4.5 510

D4signation

Farnento

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 6.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Emplacement : Désignation :

Farmento 4.5 \$104.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - mollo 8.

30 - A saveur neutre (1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenna - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

DEMONINATION / Farmento EMPLACEMENT /

4.5 \$ 104.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont Boorco

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (5), saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ...8-11.

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

N° d'ordre : 1488 05 Désignation : Farnento Emplacement : 455.10

: 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/LZ : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) · Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V: 268 - en U: 269 - autre: 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle)

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

```
Origine:
Emplacement: du pl 5 8 10
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - 2 - 3)
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2)-(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - (3) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
                 ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

ni Désignation: Farmento

No d'ordre :

Domerque 80

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2015 CodeVar: 150

Code Oiv 301 Oiv 302 Oiv 303 Oiv 304 Oiv

305

Oiv

CodeIntro: 150Mtp23

Nom Var: Syrah

début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)

coloration des feuilles en automne

Observateur:

précoce

Rougeâtre

Moyenne

Rouge

Emplacement: Vass2R01s126-130

tardive

Rouge

très tardive

rouge

PHENOLOGIE								
Descripteur	1	3	5	7	9			
époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive			
époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive			
époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive			
maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive			
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF			The second second second	PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR			

très précoce

Jaune

violet 306 foncé VIGUEUR ET CROISSANCE vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte Très forte Oiv 351 absent ou croissance prompts-bourgeons (avant Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

RESISTANCE très faible ou élevée ou Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe moyenne faible très élevée

	Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
	1	4		31.13	4	
	2	4 2187	टा <i>र</i> ड	3/13	3	
0	do filet	Faible 2		2/4	o laible	
	4	6	3/13	2/4	6	
	5	7	31/3 2deb	2/4	13	
	Moyenne	21		11/04 +4	26	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	27/5 +3		20/07	24/07 +1	17/08+1	

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8	17/08	
IR	17"	20.21.	
Valeur papier PH			

Remarque: acide (10/06)

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2014

Syrah N

Code introduction: 23

Observateur: B. Genna

5

Code cépage : Nom introduction:

Emplacement: 2 RA 5/126.130

7

9

		PHENOLOGIE		
Code	Descripteur	1	3	
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	
Oiv 302	époque de floraison	tràs prácaca	medagaa	

Oiv moyenne tardive très tardive Oiv tardive très tardive époque de floraison moyenne Oiv 303 époque de véraison très précoce tardive très tardive précoce moyenne Oiv 304 maturité physiologique de la baie très précoce précoce moyenne tardive très tardive début de l'aoûtement (entrenoeuds de la Oiv 305 très précoce précoce Moyenne tardive très tardive base) Oiv 306 coloration des feuilles en automne jaune rougeâtre rouge rouge foncé | rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe	très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de		lébourrement	Nbre grappes	Fertilité
Souche	bourgeons	début	moitié (oiv 301)	(oiv 153)	(grappes/10 yeux)
1					
2					
3					
4					
5					
Moyenne		20/03	25/03+8		

Date	floraison	Taux de	Date de	véraison	Date de	Début
début	moitié (oiv 302)	nouaison % (oiv 501)	début	moitié (oiv 303)	maturité (oiv 304)	aoûtement (oiv 306)
20/05	23/05,	2	21/07	26/07	06/09/14	

SUIVI DE MATURITE

				DUITI	DE MALOK			
Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09		
IR	15°8	18°5	1904	2104	22°	22°3		
Valeur papier PH								

Remarque:

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2013

Observateur:

CodeVar: 150

CodeIntro: 150Mtp23 Nom Var: Syrah 110Hon

Emplacement: Vass2R01s126-130

	Pi	HENOLOGIE				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte Très forte croissance prompts-bourgeons (avant absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

 RESISTANCE

 Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe
 très faible ou faible
 moyenne
 élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	24/3	29 (3 3d(b+300002213	5	
2	5	21/3	29/3 13.2déba, 2001 4713	1	
3 Reco	you en Jormation	19 mg 2913	29/3	0	
4	8	25/3 3dily 2	13 29 13	4	
5	10	22/3	27/3 less 13 provide TED	15	
Moyenne	34	0 0	29/3 +5	25	7

	Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
<	3/06	06.06		31107	06/08+2	12.030	

Remarque:

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2012

Observateur:

Code introduction: 150Mtp23 Nom introduction: Syrah

Emplacement: Vass2R01s126-130

	PE	IENOLOGIE				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) Faible Très forte très faible. Moyenne Forte croissance prompts-bourgeons (avant Absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe	très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
		Taible		the state of the same	ties elevee

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/55	Fertilité (grappes/10 yeux)	
1	12		19/3	9		
2	8		16/3	2		
3	8		19/3	O faille	fouch mon adu	21
4	8		1913	4		5
5	9		22/3	6		
Moyenne	37		19 3 -9	21	6	

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	1/06+3		24.07	01.08.+1	06.09	

SUIVI DE MATURITE

Dates	20.08	29.08	06.09			
IR	18.8-20 A tris>	Aide	OK OHT DeadAS			
Valeur papier PH			Eq.			

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2011

Observateur:

Cépage : Syrah

yrah Code introduction: 150Mtp23

Nom introduction : Syrah Motton

Emplacement: Vass2R01s126-130

-									
- D	ш		TAIT	0	m	0	0	т	15
	н	185	13	۹.	20	, T. P	N.Y	ш	ш.

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe	trè	s faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée	
---------	-------------------------------------	-----	--------------------	---------	--	--------------------------	--

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		18/3	4	
2	6		1813	9	
3					
4	6		1913	9	
5	7		19/3 426	14	
Moyenne	25		1913+2	36	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13-05	17-05+3			22-07 11	9-09+3	

Dates 18-08-11 25-09, 31-08.

IR 12,5-16,6. 12,6.20. 18,4-12,2

ynusu A. 12 18,2

Valeur papier PH

Valeur papier PH

Valeur papier PH

Suivi de Maturite Reste un jen faciele.

Remarque: 21-06-11 RAS Viloison + le 30-06 - rich le 06-07-12-07 = 1600 Laire por Quari TV. 620-07

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2010

Code introduction: 23

Code cépage : 0150 Code i Nom introduction : SYRAH N Observateur:

Emplacement: Vass2R01s126-130

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux** (**floraison**): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** (**avant rognage**, **ou maturité**): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

ARemost 10

Souche bourgeons début			débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)	
1	1 8 30/3		6dil 83/4	7		
2	6		30/3	7		
3	1					
4	7	doord 76/3	31 3	12		
5	7	29/3	114	7		
Moyenne	28	770	3/13 +2	33	12	

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
31.05	03.06		25/07	2/08 +2	10/9	

+1

Veraison avancée

+2

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année:2010

Code cépage: 0150

Code introduction: 03

Observateur:

150-28

Nom introduction: SYRAH N

MRJ831A Emplacement: Vass10R04s576-580

Phénologie

2R10196-130 3R10M1 à 165

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	1			1	
2	\				
3	2		29/3		
4	10		30/3		
5	7		30/3		
Moyenne			30/3 +1		

THE REAL PROPERTY.	Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	27/05	01.06			26/07	219	